



## FICHA TECNICA

### RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA FORMULADORA

#### **ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Circunvalación Sur ·5

C.P. 45070

Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco

Teléfonos y fax:

Tel: (33) 31 33 00 13

Fax: (33) 31 33 00 13 ext 108

### Composición Garantizada

COMPOSICION	% (p/v)
Nitrógeno	3.59
Fósforo	4.19
Potasio	3.04
Boro	0.0084
Zinc	0.0598
Fierro	0.0717
Manganeso	0.0430
Molibdeno	0.0050
Cobre	0.0395
Aminoácidos libres Acido glutámico, Lisina, Leucina, Cistina y Triptófano	11.96
Péptidos y polipéptidos	16.04

### DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

**Estado físico:** Líquido  
**Color:** Café  
**Olor:** Característico  
**Solubilidad:** Altamente soluble en agua  
**pH :** 3.5

### “INSTRUCCIONES DE USO”

#### INFORMACIÓN GENERAL

**GRINAMIN FORTE®** promueve la maduración temprana, intensifica el color y ayuda a aumentar la firmeza de los frutos.

**GRINAMIN FORTE®** Favorece la corrección de deficiencias nutricionales.

**GRINAMIN FORTE®** Proporciona una rápida acción antiestrés al usarlo en condiciones desfavorables del clima, suelo, enfermedades, ataques de plagas y manejo de campo, debido a su acción energizante.

CULTIVOS	DOSIS	NUMERO DE APLICACIONES	OBSERVACIONES
Tomate y chile	500 - 700ml / ha	3 a 5	Iniciar al trasplante, repetir cada 15 días
Papa	1000ml / ha	4 a 6	Iniciar a la brotación, repetir con aplicaciones de foliares y en momento de estrés desde la aparición de la cuarta hoja
Cebolla, ajo y espárrago	500 ml / ha	2 a 4	Iniciar a la brotación, repetir con aplicaciones de foliares y en momento de estrés desde la aparición de la cuarta hoja.
Fresa	500 ml / ha	3 a 5	Inicio de floración, repetir cada 15 días

Cucurbitáceas Melón, sandía, pepino, etc.	500 ml / ha	2 a 4	Al trasplante, repetir al inicio de cuajado y formación de frutos.
Flores y ornamentales	250mL-100L agua	3 a 5	En el enraizamiento de esquejes, repetir de acuerdo a condiciones.
Crucíferas Brócoli, coliflor y coles	500 - 750ml / ha	3 a 5	Iniciar al trasplante, repetir cada 15 días.

Se recomienda también para: cereales, maíz, trigo, cebada (750ml-1000ml / ha) y frutales como aguacate, cítricos, papaya y mango (300 ml/100 L agua).

**METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Agite el producto. Girar presionando ligeramente hasta que el sello se rompa por completo al nivel del contorno de la boca del envase.

Llene los recipientes de los equipos de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames.

Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de aspersión e iniciar la agitación, vierta la cantidad recomendada de **GRINAMIN FORTE®** y complete la capacidad del tanque con el agua necesaria. Mantener la agitación durante la mezcla y aplicación del producto al cultivo.

Número de Registro Sanitario: **RSCO- 213/X/2012**